

# ALERTA ROJO: *Echinochloa crus-galli* “CAPÍN ARROZ”, resistente a glifosato e imidazolinonas en la Provincia de Entre Ríos.

Metzler M.J.<sup>1</sup> Rampoldi A.<sup>2</sup>, y Dellaferrera I.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Grupo Ecofisiología Vegetal y Manejo de Cultivos. INTA EEA Paraná

<sup>2</sup>Disherbología, INTA EEA Concepción del Uruguay

<sup>3</sup>FCA-UNL

En un trabajo conjunto entre la EEA Paraná, EEA Concepción del Uruguay del INTA y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, bajo la responsabilidad de los profesionales Marcelo Metzler, Andrés Rampoldi e Ignacio Dellaferrera, obtuvieron las curvas de dosis-respuesta para el herbicida glifosato y la mezcla comercial de imazapic (17,5%) + imazapir (52,5%) en estado de plántula de *Echinochloa crus-galli* (Figura 1). Se recolectaron biotipos con sospecha de resistencia a ambos activos en 4 localidades de la provincia de Entre Ríos (Santa Anita, Chajari, San Salvador y Villa Elisa), mientras que Concepción del Uruguay (E) fue el biotipo susceptible. Los resultados observados arrojaron los siguientes índices de resistencia (IR):


**Tabla 1.** Índice de resistencia para glifosato y la mezcla comercial de imazapic (17,5%) + imazapir (52,5%) (imidazolinonas) para las localidades de Santa Anita (F), Chajari (A), San Salvador (O) y Villa Elisa (G)

Localidad	(IR) glifosato	(IR) imazapic (17,5%) + imazapir (52,5%)
Santa Anita (F)	13,087	17,24
Chajari (A)	8,15	2,42
San Salvador (O)	10,39	3,54
Villa Elisa (G)	1,14	59,79




**Figura 1.** Plántulas de los diferentes biotipos de *Echinochloa crus-galli* recolectados al momento de la aplicación.

Los resultados indican que a excepción del biotipo de Villa Elisa que fue solamente resistente a imazapic (17,5%) + imazapir (52,5%), todos los biotipos analizados son resistentes a ambos activos (figuras 1 y 2). Hasta ahora no se había reportado en Argentina la resistencia a glifosato, ni imidazolinonas para la especie *Echinochloa crus-galli*.



**Figura 2.** Curva de dosis respuesta para peso fresco de biotipos de *Echinochloa crus-galli*, expuesta a dosis crecientes de glifosato para las localidades de Santa Anita (F), Chajarí (A), San Salvador (O) y Villa Elisa (G)



**Figura 3.** Curva de dosis respuesta para peso fresco de biotipos de *Echinochloa crus-galli*, expuesta a dosis crecientes de la mezcla comercial de imazapic (17,5%) + imazapir (52,5%) para las localidades de Santa Anita (F), Chajarí (A), San Salvador (O) y Villa Elisa (G)