

FUNGICIDA TRIDIUM

EL TRIGO AVANZA. Y SIN RESISTENCIA.



¿QUÉ ES TRIDIUM?

Fungicida de acción sistémica y de contacto, para el control de Roya anaranjada, Roya amarilla* y Mancha amarilla.

Triple mezcla con tres mecanismos de acción diferentes, contiene Mancozeb + Azoxistrobina + Tebuconazole.

Formulación en gránulos dispersables (WG).

Presentación Caja 2 x 10Kg.

(*) En proceso de registro

BENEFICIOS DEL USO DE TRIDIUM

Excelente control del complejo de enfermedades foliares.

Previene la generación de resistencia por tener acción multisitio en uno de sus tres activos.

Aplicación de calidad superior por su formulación WG.


Asegura el potencial de tu cultivo por su acción preventiva y curativa.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS KG/HA	TIEMPO DE Carencia	MOMENTO DE Aplicación entre Z32 y Z39
Trigo	Mancha amarilla (Drechslera <i>tritici</i>) Roya anaranjada (Puccinia <i>recondita</i>) Roya amarilla (Puccinia <i>striiformis</i>)*	2	35	Aplicar cuando se observen los primeros síntomas siempre que las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de las enfermedades
Cebada*	Mancha en red (Drechslera teres)		30	

(*) En proceso de registro


POSICIONAMIENTO TÉCNICO DE TRIDIUM



RESPUESTA EN RENDIMIENTO AL CONTROL DE ROYAS Y MANCHAS FOLIARES EN TRIGO

Referente Técnico: Ing. Agr. González Montaner. Localidades: San Rufino, La Dolores, San Mateo, La Marucha y Tehuelche.
Variedades: Algarrobo, N801, N802 y Serpiente. Momento de aplicación: Z39.
Enfermedades presentes: Royas y Mancha amarilla.





EVALUACIÓN DE FUNGICIDAS EN TRIGO, AAPRESID REGIONAL MAR DEL PLATA

Enfermedades presentes:


- Roya anaranjada (Puccinia recondita)
- Roya amarilla (Puccinia striiformis)
- Mancha amarilla (Drechslera tritici)

Referente Técnico: Regional AAPRESID.


Establecimiento: El Silencio.

Variedades: Algarrobo, N801, N802 y Serpiente.

Momento de aplicación: Z39



 Tridium es la única triple mezcla multisitio registrada, que previene la aparición de resistencia a las enfermedades.



EVALUACIÓN DE FUNGICIDAS PARA EL CONTROL DE ROYA AMARILLA

Enfermedades presentes:

- Roya anaranjada o de la hoja (Puccinia recondita): Incidencia (%): 10-12; Severidad (%): 1-2.
- Roya amarilla o estriada (Puccinia *striiformis*): Incidencia (%): 8-10; Severidad (%): 2-3
- Mancha amarilla (Drechslera tritici): Incidencia (%): 10-12; Severidad (%): 2-3.

Referente Técnico: Ing. Agr. Lucrecia Couretot. Localidad: Pergamino, Provincia de Buenos Aires. Variedad: Algarrobo. Momento de aplicación: Z45

